



VARIANTA1

1. Care din explorarile enumerate mai jos sunt relevante pt sediul hematuriei macroscopice?

- a. Examenul macroscopic al urinei
- b. Proba celor trei pahare
- c. Examenul microscopului al sedimentului urinar
- d. Examenul clinic obiectiv

2. Diagnosticul diferential al abcesului cald trebuie facut cu :

- a. furuncul, abces rece , anevrism arterial , diferite tumori
- b. erizipel , gangrena gazoasa, furuncul , abces rece
- c. erizipel , gangrena gazoasa , furuncul , abces rece , anevrism arterial , diferite tumori
- d. gangrena gazoasa, furuncul , abces rece , anevrism arterial , diferite tumori

3. Succesiunea corecta a actiunilor in cadrul resuscitarii la adult este :

- a. verificarea starii de constienta , eliberarea cailor aeriene , verificarea respiratiei, verificarea circulatiei , efectuarea respiratiei artificiale si a masajului cardiac
- b. verificarea respiratiei , verificarea circulatiei , efectuarea respiratiei artificiale si masajului cardiac, verificarea starii de contienta
- c. verificarea starii de constienta , eliberarea cailor aeriene , verificarea respiratiei , efectuarea compresiilor toracice externe , efectuarea ventilatiilor
- d. verificarea starii de constienta , eliberarea cailor aeriene, verificarea respiratiei , verificarea circulatiei, efectuarea compresiilor toracice externe, eliberarea zonei si chemarea ambulantei

4. La cat timp dupa operatie se reia in mod obisnuit tranzitul intestinal?

- a. in dimineata urmatoare interventiei
- b. la 4-5 zile la interventiile cu rahianestezie
- c. la 48-78 ore
- d. depinde de tipul anesteziei efectuate.

5. Tratamentul EPA lezional de origine infectioasa implica:

- a. corticoterapie
- b. administrare de tetraciclina
- c. administrare de morfina
- d. sangerare abunden

6. Sindromul Adam Stokes :

- a) determina ischemie cardiaca acuta
- b) determina ischemie cerebrala cronica
- c) este provocat de rarirea brusca a contractiilor ventriculare
- d) provoacă insuficienta venoasa cronica

7. Boli care necesita precautii de prevenire a infectiilor prin picături Pflugger:

- a) parotidita epidemica
- b) epididimita
- c) difteria
- d) tiroidita

8. Semnele de certitudine într-o fractură a membrilor sunt:

- a) mobilitate anormală, crepitație osoasă, întreruperea continuității osului;
- b) netransmisibilitatea mișcărilor distal de fractură, deformarea regiunii;
- c) mobilitate anormală, crepitație osoasă, impotență funcțională.

9. Starea de colaps vascular se recunoaște după următoarele manifestări de dependență:

- a) pacient inert, somnolent, cu tegumente palide și reci, hipotensiune, puls filiform;
- b) pacient agitat, tahicardie, hipertensiv;
- c) pacient somnolent, transpirat.

10. Copilul L., de 12 ani, nu are poftă de mâncare, prezintă stare de disconfort și prurit anal; prioritar, în intervențiile medicale, este:

- a) baia generală, baia pe porțiuni;

- b) recoltarea probelor de scaun pentru examenul coproparazitologic;
- c) alimentarea la timp a copilului;
- d) scoaterea la aer a copilului.

11. Cele mai importante cauze care determina Insuficienta respiratorie acuta sunt urmatoarele:

- a) aer viciat prin scaderea O₂ sau exces de CO₂
- b) procese laringotraheobronsice, accidente obstructive ale cailor respiratorii superioare, procese pulmonare si pleurale
- c) consum excesiv de alcool si fumatul

12. În caz de convulsii, la un sugar de 8 luni cu temperatură de 39,9°C, se vor aplica următoarele intervenții:

- a) administrarea de diazepam 1-2 zile;
- b) administrarea de analeptice cardiovasculare;
- c) administrarea de antibiotice;
- d) comprese călduțe pe frunte;
- e) administrarea de fenobarbital 1/2 fiolă.

13. Cum se testează eventuala alergie la novocaină:

- a) prin injecție intradermică;
- b) prin injecție intramusculară;
- c) prin injecție intravenoasă.

14. Când calea naturală eficientă în administrarea alimentelor nu poate fi folosită pentru bolnavul chirurgical, cel puțin în primele zile postoperator, putem folosi următoarele căi:

- a) gastrostomia;
- b) calea intravenoasă;
- c) sonda nazogastrică sau nazojejunală.

15. Cianoza apărută la un bolnav, ca urmare a întreruperii administrării de O₂, ce poate fi corectată doar prin administrarea de O₂ - 100% se datorează adesea:

- a) retenției de CO₂;

- b) colapsului pulmonar masiv;
- c) hipovolemiei;
- d) pneumotoraxului în tensiune.

16. Iradierea durerii toracice în brațul stâng este caracteristică pentru:

- a) o afecțiune coronariană;
- b) o spondilartroză
- c) un pneumotorax;
- d) o radiculită;
- e) o pancreatită acută.

17. În cazul efectuării unui EKG, electrodul roșu se aplică la:

- a) mâna dreaptă;
- b) mâna stângă;
- c) piciorul drept.

18. În cancerul gastric durerea apare:

- a) la 30 minute postprandial;
- b) la o oră postprandial calmată de ingestia de lichide;
- c) permanentă.

19. Precauțiunile standard sunt:

- a. Igiena mainilor, utilizarea echipamentului individual de protecție, manipularea în condiții de siguranță a echipamentelor medicale, practici sigure de injectare igiena respiratorie și eticheta de tuse
- b. Igiena mainilor, utilizarea echipamentului individual de protecție, colectarea și transportul deșeurilor
- c. Igiena mainilor, utilizarea echipamentului individual de protecție

20. Atitudinea cadrului medical sanitar privind profilaxia AES (accident prin expunere la sange) în caz de expunere cutanată:

- a) a. se spală imediat locul cu apă și săpun și apoi se clătește; se utilizează un antiseptic, timp de contact minim 5 minute; se stimulează sângerarea;
- b) b. se utilizează un antiseptic, timp de contact minim 5 minute; se stimulează sângerarea;
- c) c. se spală imediat locul cu apă și săpun și apoi se clătește, se utilizează un antiseptic; este interzisă sângerarea.

V1

1-B

2-A

3-C

4-C

5-A,B

6-C

7-A,C

8-A

9-A

10-B

11-A,B

12-E

13-A

14-C

15-C

16-A

17-A

18-C

19-A

20-C



[Handwritten signatures in blue ink]